



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期									
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上		
インフルエンザ菌b型 (ヒブ)	不活化			①	②	③						④ (注1)													
肺炎球菌 (PCV13)	不活化			①	②	③						④											(注2)		
B型肝炎	ユニバーサル 不活化			①	②																		(注3)		
	母子感染予防	①	②									③													
ロタウイルス	1価 生			①	②					(注4)															
	5価			①	②	③				(注5)															
4種混合 (DPT-IPV)	不活化			①	②	③						④ (注6)				(7.5歳まで)									
3種混合 (DPT)	不活化			①	②	③						④ (注6)				(7.5歳まで)									
2種混合 (DT)	不活化																				⑤ (注7)	⑥11-12歳 (注8)			
ポリオ (IPV)	不活化			①	②	③						④ (注6)				(7.5歳まで)							11歳 ①		
BCG	生										①												12歳		
麻疹・風疹混合 (MR)	生															①							② (注10)		
水痘	生															①							② (注11)		
おたふくかぜ	生															①							② (注12)		
日本脳炎	不活化																						① ② ③ (7.5歳まで)	④9-12歳	
インフルエンザ	不活化																						毎年 (10、11月などに) ①②	13歳より①	
ヒトパピローマウイルス (HPV)	2価,4価 不活化																						(注13)	小6 中1 ①②③ (注14)	中2～ 高1 (注15)
	9価 不活化																						(注13)	小6 中1 ①② (注14)	中2～ 高1 (注15)

定期接種の推奨期間
  定期接種の接種可能な期間
  任意接種の推奨期間
  任意接種の接種可能な期間
  添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
  健康保険での接種時期